

Псевдотуберкулез - это острое инфекционное заболевание, вызываемое псевдотуберкулезным микробом.

В нашей стране заболевание распространено на Дальнем Востоке - Приморский и Хабаровские края, Амурская, Магаданская, Сахалинская, Камчатская области, Чукотский автономный округ.

По данным Pro-medmail от 13.04.2009г. в текущем году псевдотуберкулез зарегистрирован в Амурской области - 7 случаев, причем все заболевшие - дети до 6 лет.



Источниками заражения являются лесные и полевые грызуны (полевые мыши) и, возможно,



источниками инфекции могут быть также домашние животные, зараженные псевдотуберкулезом.



Заражение людей непосредственно в природных очагах происходит редко. Инфицированные псевдотуберкулезом синантропные грызуны, выделяя возбудителя с испражнениями и мочой, заражают пищевые продукты в предприятиях общественного питания, торговли, пищеблоках детских учреждений, складах, овощехранилищах, подвалах, а также и водоисточники.

Благоприятными условиями для сохранения и размножения возбудителей во внешней среде и пищевых продуктах являются низкая температура и повышенная влажность.

Люди, преимущественно, за



отреблении продук

Заболевание проявляется через 3-18 дней после инфицирования. Обычно, начало - острое с появлением головной боли, повышенной температуры, общей слабости. Могут проявляться катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей, боли в горле при глотании, мышечно-суставные боли, изменения со стороны органов пищеварения.

Период разгара болезни характеризуется высокой температурой до 38-39°C, скарлатиноподобной сыпью, усилением симптомов интоксикации, а также со стороны суставов, желудочно-кишечного тракта и печени. Длительность этого периода составляет от 1 до 11 дней.

На 2-3 день болезни у больных появляется желтушное окрашивание кожи склер, держится от 5 до 10 дней и с улучшением общего состояния проходит.

Вакцинация не проводится.

В профилактике псевдотуберкулеза основное внимание должно быть направлено на выполнение мер по предотвращению проникновения грызунов в помещения пищевых объектов, особенно овощехранилищ, продовольственных складов, жилых помещений, а также по недопущению доступа их к пищевым продуктам.

С целью снижения численности грызунов в населенных пунктах и на отдельных объектах необходимо проводить регулярные мышеистребительные (дератизационные) мероприятия.

Особое значение приобретает соблюдение правил приготовления, хранения, реализации готовой пищи.

Помните: псевдотуберкулезная инфекция опасная!

Не рискуйте своим здоровьем: при появлении признаков заболевания, обращайтесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением.