Лямблиоз - часто встречающееся паразита

Распространенность. По данным ВОЗ, ежегодно ля



Способ заражения - фекально-оральный и контактный. Наиболее частый источник заражения - вода, пища, загрязненные цистами лямблий. Лямблии могут передаваться от человека к человеку (в детских коллективах, работники пищевых предприятий и т.д.), при не соблюдении правил личной гигиены. От больного человека во внешнюю среду выделяется более 12 млн цист. Длительность инкубационного периода 1-2 недели.

Клинически заболевание характеризуется диареей, тошнотой, рвотой, резкими болями в верхней и средней эпигастральной области, вздутием кишечника, головными болями, потерей в весе, повышением утомляемости.

Лабораторная диагностика. Материалом для исследования являют-ся пробы фекалий и дуоденального содержимого.



Профилактика:

- соблюдение правил личной гигиены;
- контроль за питанием и водоснабжением;
- обеззараживание воды, в т.ч кипячением;

- обследование на инвазированность лямблиями (детей посещающих ДОУ, детей всех возра

Лечение: используют противопарази

ПОМНИТЕ! Не занимайтесь самолечением. При возникновении признаков заболевания, необходимо обратится к медицинскому работнику для своевременного и полноценного лечения.

ФГУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"